


ニコフェノール酸

ミコフェノール酸の主な製品



画像引用元: 中外製薬
薬剤師向けサイト

ミコフェノール酸の効くところ



妊婦・妊娠の可能性がある女性の方へ

- 妊婦：**使用できません！！**

産まれてくる子供への悪影響や流産の可能性があります。

- 妊娠の可能性のある女性：使用できますが、以下のことを守ってください

- 避妊を必ず行う**

- 定期的に妊娠していないか確認をする

(問診票[次のページへ]を参考に妊娠の有無を確認してください)

ミコフェノール酸の副作用について

- 高尿酸血症、肝障害、血液障害などが起こることがあり、血液検査で確認しながら
使用します。
- また、感染症、下痢、だるさ、めまいなどに注意が必要です。

体調で何か気になる事があれば医師や薬剤師にご相談ください

服用中の女性と授乳婦の方へ

- 服用中でお子さんを望む場合、以下のことを行ってください
 - ☆医師や医療従事者へ妊娠の希望を話しましょう。
 - ☆安全のため、薬をやめた時から**6週間以上経過してから妊活を行いましょう**
 - ・薬が体から抜けるのに有する期間は、通常4週間とされています
 - ・安全のため、さらに2週間を加えた6週間以上としています
 - ☆出産後に医師と相談しながら、服用再開を決めましょう
- 授乳：避けるようにしてください。
(動物実験で、母乳への移行性が言われています)

服用中の妊娠に関する問診票

- 服用中、妊娠している可能性がないことを確認するために、以下の項目を確認するようにしてください。
- 確認を行い妊娠の可能性がある場合は、医師に相談するようにしてください
- 直近の月経はいつですか？
- 月経周期はどのくらいですか？周期は、順ですか不順ですか？ 持続で何日間ありますか？
- 今周期は妊娠の可能性はありますか？
- 妊娠検査をご自身で行いましたか？
- 妊娠検査を行った場合の結果は、陰性ですか？陽性ですか？

ミコフェノール酸と飲み合わせ

・注意するものはありますが、禁止するものではありません。

・一緒に飲むときは、医師や薬剤師に相談しましょう。

左の図の薬は、製品名ではありません。→

骨髄抑制が
起こる恐れがある

- ・免疫抑制薬：アザチオプリン、ミゾリビン

ミコフェノール酸の
血中濃度が
低くなる

- ・コレスチラミン、マグネシウム、リファンピシン
- ・胃薬：アルミニウム含有制酸剤、ランソプラゾール

副作用が
表れやすくなる

- ・抗真菌薬：アシクロビル、バラシクロビルなど

ミコフェノール酸懸濁用散の注意点

飲むとき

- 他の薬と混ぜないこと
- 激しく振ってから飲むこと

薬液が

目や服、身体についた時

- 眼→水で洗浄後、眼科へ
- 服、身体→水と石鹼で洗い流す

薬液が漏れた時

- 水で湿らせたペーパータオル等で拭き取る

ミコフェノール酸懸濁用散の注意点

残った薬の有効期限

- 薬をもらってから、60日間以上経過したものは使わない

破棄方法

- 自治体のルールに従い、水に流さずボトルごと捨てる

薬の飲み方等

- 製薬会社から「セルセプト懸濁用散31.8%服用にあたって」という資料が出ています。
- 薬局に問い合わせてもらいましょう

まとめ

- ✓ 妊婦は、使用できません！
- ✓ お子様を望む場合は、必ず医療従事者へご相談ください。
- ✓ 懸濁用散の使用は、必ず薬剤師から十分な説明を受けてください。

- ✓ 以下の方は、医師にと相談するようにしましょう
 - 体調で、いつもと違うことが数日続く人
 - 妊婦や授乳婦、お子様を望む女性の人

引用・参考文献

- ・中外製薬薬剤師向けサイト:<https://chugai-pharm.jp/product/cel/pow/>
- ・セルセプトカプセル250mg: インタビューフォーム、添付文書
- ・セルセプト催奇形性に関する情報及び適正使用のお願い